

### Définition

Le syndrome de sevrage néonatal peut apparaître chez le nouveau-né lorsque la mère a consommé certaines drogues (opioïdes incluant l'héroïne, opiacés, tabac, etc.) pendant sa grossesse. Ainsi, pendant la grossesse, le bébé reçoit la substance en question par le biais du placenta. Lors de la naissance, le bébé n'a plus accès à la ou les substances en question. Cette coupure à la naissance peut alors amener des symptômes de sevrage.

### Symptômes

Les symptômes apparaissent généralement à l'intérieur des deux semaines suivant la naissance et peuvent toucher le système nerveux, gastro-intestinal et respiratoire. Les symptômes possibles sont nombreux, par exemple :

- Tremblements
- Irritabilité, pleurs aigus
- Difficulté à ingérer la nourriture, vomissements en jets, selles molles
- Congestion nasale
- Crises épileptiques (plutôt rare)

Les symptômes sont souvent légers et disparaissent d'eux-mêmes, mais peuvent parfois nécessiter une prise en charge médicale. Un [document à l'intention des parents](#) (et des professionnels de la santé) dont le nouveau-né est atteint d'un syndrome de sevrage néonatal est disponible en ligne (en anglais seulement).

Il est primordial de toujours aviser et consulter le médecin traitant lorsqu'il y a dépendance (drogue, alcool, tabac).

### Pour en savoir plus...

Aboutkidshealth. (2009). [Syndrome de sevrage néonatal](#).

### Références

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. (2013). Consommation de drogues licites et illicites pendant la grossesse : Répercussions sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Repéré à <http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Drug-Use-during-Pregnancy-Report-2013-fr.pdf>.

Nelson, C., R. Bhagat, K. Browning et L. Mills. (2011). *Baby steps: Caring for babies with prenatal substance exposure*, 3 e éd., Victoria (C.-B.). Ministère de l'Enfance et du Développement de la famille de la Colombie-Britannique. Repéré à : <http://www.mcf.gov.bc.ca/foster/pdf/BabySteps.pdf>